monsieur balanger chirurgien juré pour la ville de thonnay boutonne rend comte a l'academie dans son memoire d'une espece de hernie quil a trouvé a l'ouverture d'un cadavre. la resemblance de cette maladie avec le volvulus le determina a faire prendre au malade, ~~mais~~ inutilement du mercure coulant: mais les simptomes continuant a sevir de plus en plus firent perir le malade: ce chirurgien au lieu de trouver dans l'ouverture du cadavre la confirmation du jugement quil avoit porté sur cette maladie, reconut que la fin de l'ileum pres sa jonction avec le secum de la longueur d'environ sept a huit pouce diminué de volume, et gangrené etoit passé par une ouverture au peritoine dans la region lombaire, et s'etoit insinué jusque dans le tissu cellulaire de la membrane adipeuse du rein: l'ouverture du peritoine formoit la meme dimantion, et la meme resistance que l'anneau de l'oblique externe par une sorte de bourlet epais: la membrane adipeuse, et la surface interieure du peritoine voisines de l'ileum etoient gangrenée le rein avoit une figure tres irreguliaire, et beaucoup plus petit que dans l'etat naturel; la capsule atrabilaire etoit confondue dans la tumeur au point quon ne pouvoit la distinguer. monsieur balanger atribue la cause de cette maladie a un effort que le sujet fit un an auparavant en voulant tourner une chaise d'equipage, dans lequel effort il sentit une espece de ~~[illegible]~~ craquement comme un coup de fouet dans la region lombaire droite avec une grande douleur qui a diminué a la verité, mais qui est toujour resté fixe dans cette partie: il conclu de la que dans ce tems il s'est fait rupture du peritoine, qui a permis a l'intestin ileum de former cette maladie quil caracterise de hernie des plus singuliaire.

je ne pense pas de meme que monsieur balanger sur la formation de cette hernie; je suis fondé a croire que lors de l'effort il est arivé une distantion considerable dans le tissu cellulaire du peritoine et de la membrane adipeuse, que le croupissement des liqueurs epanchées ou leur stase dans les vaisseaux a produit une supuration gangreneuse

ARC 16 d.3 n°.78 p.2

qui a entamé le peritoine dans un point, et dans les derniers
tems l'intestin ileum s'est echapé par cette ouverture ; que la
presence de l'intestin a produit la callosité de l'ulcere du
peritoine, et que a proportion quelle a augmenté l'intestin a eté
etranglé ; et a souffert les memes acidents qui arivent dans une
vrai hernie.
quoy qu'il en soit l'observation de monsieur balanger est fort
interessante, et elle merite de trouver un place dans les
memoires de l'academie. perron

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE